	Doença	Sintomas	Incubação / Contágio	Prevenção	Tratamento	Afastamento
Catapora	Causada pelo *Herpes Vírus varicela*, predomina em crianças dos 5 aos 9 anos.	Os primeiros sintomas são febre, mal-estar, dor de cabeça e falta de apetite. Evolui com bolhas de água claras, com halo avermelhado, que evoluem com crostas.	Incubação de 14 dias e contágio por 7 dias.	A prevenção faz-se com aleitamento materno e vacina.	Sintomáticos e controle de infecções de pele (corte das unhas).	O aluno não deve frequentar o Colégio por 7 dias.
Caxumba	Doença viral aguda causada pelo *Paramyxovirus parotiditis*, predomina dos 5 aos 10 anos.	Edema mole e doloroso da glândula parótida e/ou das salivares. Pode ser acompanhada de febre, mal-estar, dor de ouvido e de cabeça. A infecção pode ser inaparente.	Incubação de 14 a 21 dias e contágio de 24 horas antes a 7 dias depois do aumento da glândula.	Vacinação e evitando-se contato com a pessoa acometida.	O tratamento faz-se com sintomáticos.	O aluno não deve frequentar o Colégio por 7 dias.
Conjuntivite	Processo inflamatório na conjuntiva. As formas bacteriana e viral são contagiosas; a alérgica, não.	Olho vermelho, lacrimejamento e prurido. A forma bacteriana pode ter secreção purulenta, e a forma viral, febre e sinais de resfriado.	A incubação é variável e o contágio acontece pelo ar ou pelo contato com a secreção.	Evitar o contato com pessoas acometidas. Lavar sempre as mãos.	Depende da causa, mas deve ser acompanhado pelo oftalmologista.	Afastamento de 3 a15 dias, dependendo do tipo de conjuntivite.
Coqueluche	Doença causada pela Bordetella pertussis. Predomina em lactentes e crianças pequenas, mas pode acometer qualquer idade.	Fase inicial ou catarral, coriza, lacrimejamento febrícula e tosse. Fase paroxística: acesso de tosse com expectoração de muco espesso e vômitos. Fase convalescença: crises mais fracas e espassadas . Dura aproximadamente 3 semanas.	Incubação de 6 a 20 dias. O contágio é por contato direto com infectados, 7 dias após contagio ate 3 semanas após começo do paroxismo	A prevenção faz-se vacinação e controle dos contactantes.	Dependendo da fase e manifestação clinica. Na fase catarral esta indicado antibiótico.	Afastamento de até 7 dias do início do antibiótico.
Escarlatina	Doença exantemática causada pela bactéria *Estreptococos Hemolítico*, predomina em crianças de 3 a 12 anos.	Início brusco com febre alta, dor de cabeça e dor abdominal. Seguem o aumento das amídalas (com ou sem placas brancas) e o aparecimento de língua vermelha carnosa.	Incubação de 2 a 7 dias. O contágio acontece até 48h após o início do tratamento, por contato respiratório ou com as lesões de pele.	Tratamento precoce de impetigo e amidalites.	Antibiótico, sempre sob orientação médica.	Afastamento de até 48h após o início do tratamento.
(H_1 N_1)	Causada pelo virus *Influenza* (H_1 N_1) acomete qualquer idade.	Semelhante ao resfriado, há febre, tosse, dores no corpo e dor de cabeça.	Incubação de 7 a 10 dias. O contágio é de 7 dias para adultos. Para crianças, 2 dias antes a 14 dias depois do início dos sintomas.	Vacina e hábitos regulares de higiene.	Anti-viral e sitomáticos	Afastamento de 10 dias (controversa).
Pediculose	Infestação de piolho e lesões de pele causadas por sua picada, geralmente no couro cabeludo.	Os piolhos são parasitas que se alimentam de sangue. Sua picada causa intensa coceira, geralmente, no couro cabeludo.	Do ovo ao parasita adulto decorrem 16 dias. O contágio ocorre pelo contato com pessoas infestadas, ou com roupas, bonés, toalhas, pentes.	Não emprestar, nem tomar emprestado, pentes, escovas, tiaras, bonés, toalhas.	Xampus e loções para tratamento local, ou medicação, via oral.	O aluno não deve frequentar o Colégio durante o período de doença.
Rubéola	Doença exantemática causada por vírus, de alta contagiosidade, que ocorre durante a infância e adolescência. Em gestantes, apresenta risco ao feto.	Pode ocorrer febre baixa, com aumento dos gânglios retroauriculares. Uma erupção rósea acomete face e pescoço e se generaliza em 24h, desaparecendo em 3 dias.	Incubação de 12 a 23 dias. O contágio é por contato direto com infectados, de 5 dias antes até 7 dias após o aparecimento dos sintomas.	A prevenção faz-se com aleitamento materno e vacina.	O tratamento faz-se com sintomáticos.	Afastamento até 7 dias após o aparecimento do exantema (manchas).
Covid-19	A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 de elevada transmissibilidade e de distribuição global.	Febre ou calafrios, tosse, falta de ar ou dificuldade para respirar, fadiga, dores musculares ou no corpo, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, dor de garganta, congestão nasal, coriza, náusea ou vômito, diarréia e manchas no corpo.	O período de transmissão do vírus começa por volta de dois dias antes do surgimento do primeiro sintoma, durando até 14 dias após a aparição dos sintomas. A principal via de transmissão é aérea, por partículas que carregam o vírus.	Medidas não farmacológicas como uso da máscara, higienização correta das mãos e distanciamento. A vacinação também é muito importante.	De acordo com orientação médica.	- Isolamento de 7 dias a partir do 1°. dia de sintoma. Retorno no 8°. dia se estiver há 24h sem sintoma respiratório, sem febre, sem o uso de antitérmicos e sem necessidade de nova testagem. - É possível o isolamento de 5 dias a partir do 1° dia de sintoma. Nesse caso, no 5° dia, realizar RT-PCR ou antígeno. Se teste NEGATIVO e 24h sem sintoma respiratório, sem febre e sem o uso de antitérmicos, retorno no 6° dia. Se teste POSITIVO, segue o isolamento até completarem-se os 7 dias.